

Don S. Respler MD

2 South Summit Ave Hackensack, NJ 07601

Teléfono: **201-996-9200**

Correo electrónico: AngelsofENT@gmail.com Sitio web: DrRespler.com

En ejercicio Frenulectomía (Tongue-Tie Procedimiento Release) INSTRUCCIONES cuidado postoperatorio

QUÉ esperan que

- usted puede ver una pequeña cantidad de sangre en la saliva justo después de este procedimiento
- Dolor en el día de la cirugía es rara but puede ser controlada con Tylenol
- fiebre baja (menos de 101 grados F). Puede producirse
- Las náuseas o los vómitos son raros, pero pueden ser un efecto a corto plazo de la anestesia. Ofrézcale pequeños sorbos de líquidos claros como agua o jugo de manzana y luego aumente gradualmente la ingesta de líquidos. Si el dolor, las náuseas o los vómitos continúan más allá de las 24 horas, llame a nuestra oficina.

MEDICAMENTO

- Tylenol® se puede usar el día del procedimiento para el dolor de acuerdo con las instrucciones del paquete cada 6 horas, según sea necesario.

ACTIVIDAD EI

- niño puede regresar a la escuela / actividad regular cuando esté listo, generalmente poco después del procedimiento.

DIETA

- Beber líquidos es muy importante para promover la curación.
- Intente evitar los alimentos y bebidas ácidos como el jugo de naranja y los productos de tomate durante aproximadamente una semana después del procedimiento.